

**MONITOR ANOBIDI TRAP**

INFORMAÇÕES GERAIS	Tipo de produto	Desinfestação - Feromonas e atrativos
	Descrição	Dispositivo de monitorização para detetar a presença de Anobiídi (<i>Lasioderma serricorne</i> e <i>Stegobium paniceum</i>).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Composição	Feromonas específicos
	Formato de apresentação	60 unidades. Medidas 135x200x120 mm.
	Referência interna	[3205]

MODO DE EMPREGO	Instruções de uso	Coloque a armadilha nos seguintes ambientes: Empresas alimentares, armazéns, fitoterapeutas e outros locais onde se produz ou armazena pão, massas, bolachas, chá, camomila, tabaco, nozes, especiarias, etc. A armadilha deve ser colocada a uma altura máxima de 1,8 a 2 metros. É aconselhável numerar a armadilha e o seu posicionamento relativo na planta da área monitorizada para facilitar o controlo da estação durante a monitorização periódica. Período de monitorização recomendado: durante todo o ano. Periodicidade de controlo recomendada: Semanal. Substitua a armadilha ao fim de dois meses (máximo) ou antes dependendo das condições de infestação, presença de pó e água, humidade ambiente.
	Organismos-alvo	<i>Lasioderma serricorne</i> , <i>Stegobium paniceum</i>

PERIGOS	Avisos	-
----------------	--------	---

ARMAZENAMENTO	Armazenamento	Conservar em local fresco (temperaturas inferiores a 25°C) e seco (humidade relativa inferior a 55%). Em condições de armazenamento ideais, o produto fechado dura 3 anos.
	Eliminação	A eliminação de resíduos deve cumprir os regulamentos comunitários, nacionais e locais.

OUTROS COMENTÁRIOS
Use biocidas com segurança. Sempre leia o rótulo e as informações sobre o produto antes de usá-lo.